



## NOTE

### A l'attention des Parents d'élèves

Un cas de gale commune a été diagnostiqué dans l'établissement.

La gale est une maladie fréquente et bénigne qui peut concerner tout le monde. Elle se traduit par une intense envie de se gratter, plus particulièrement le soir et peut être particulièrement incommodante.

La contamination est avant tout interhumaine, par contact direct d'un sujet atteint à un autre sujet. L'incubation est de 2 à 3 semaines.

La transmission indirecte est aussi possible par contact avec des vêtements, literie, serviettes, mais le mobilier scolaire, les cahiers, les stylos... ne peuvent pas transmettre la maladie.

Toutefois, si votre enfant présente des signes de démangeaisons à recrudescence nocturne entre les doigts, au niveau des avant-bras, des bras ou des épaules, nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant ; ce dernier vous prescrira un traitement adapté car il n'y a pas de guérison spontanée de cette maladie. Si le diagnostic est confirmé, veuillez en informer le chef d'établissement.

Une éviction scolaire est prévue jusqu'à 3 jours après le début du traitement.

## Comment éviter la transmission ?

- Se laver les mains à l'eau et au savon régulièrement et soigneusement
- Utiliser des essuie-mains à usage unique
- Ne pas échanger les vêtements

**!** Les solutions hydro-alcooliques ne sont pas efficaces contre le parasite de la gale.



## Peut-on fréquenter une collectivité ? (école, travail ...)

En attendant la guérison et pour limiter la transmission, il est recommandé que la personne atteinte de la gale (et pas les contacts proches) reste 3 jours à la maison après le début du traitement.

Dans les établissements de santé ou médico-sociaux et dans les établissements d'hébergement social, la gale n'est en aucun cas un motif d'exclusion. La personne sera placée en chambre seule, si possible.



## CONTACTS

**CClin Sud-Ouest**  
[cclin.so@chu-bordeaux.fr](mailto:cclin.so@chu-bordeaux.fr) / 05.56.79.60.58

**ARLIN Aquitaine**  
[cclin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr](mailto:cclin.so-aquitaine@chu-bordeaux.fr)  
05.56.79.60.58

**ARLIN Guadeloupe**  
[cclin.so-guadeloupe@chu-guadeloupe.fr](mailto:cclin.so-guadeloupe@chu-guadeloupe.fr)  
05.90.89.16.80

**ARLIN Guyane**  
[cclin.so.guyane@ch-cayenne.fr](mailto:cclin.so.guyane@ch-cayenne.fr)  
05.94.39.48.38

**ARLIN Limousin**  
[cclin.so-limousin@orange.fr](mailto:cclin.so-limousin@orange.fr)  
05.55.05.88.51

**ARLIN Martinique**  
[cclin.so-martinique@chu-fortdefrance.fr](mailto:cclin.so-martinique@chu-fortdefrance.fr)  
05.96.55.36.68

**ARLIN Midi-Pyrénées**  
[cclin.so-midi-pyrenees@chu-toulouse.fr](mailto:cclin.so-midi-pyrenees@chu-toulouse.fr)  
05.61.77.20.20

**ARLIN Poitou-Charentes**  
[cclin.so-poitou-charentes@chu-poitiers.fr](mailto:cclin.so-poitou-charentes@chu-poitiers.fr)  
05.49.44.42.05

## REFERENCE

Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 9 novembre 2012 relatif à l'actualisation des recommandations sur la conduite à tenir en cas de gale.

## Comprendre pour agir !



La gale est une maladie bénigne  
mais qui nécessite un traitement  
rigoureux et coordonné



En cas de doute, question ou  
interrogation, appelez votre  
médecin traitant.

## Qu'est-ce que la GALE ?

La gale est une infection cutanée due à un parasite invisible à l'œil nu appelé « sarcopte ». Ce parasite se loge et circule sous la peau en creusant des petits tunnels appelés sillons.

## Quels sont les signes à reconnaître ?

Il existe plusieurs formes de gale :



- La gale commune, la plus fréquente, se manifeste par des démangeaisons intenses qui surviennent surtout la nuit, au niveau de certaines parties du corps, en particulier les plis (entre les doigts, poignets, coudes...);
- La gale profuse se caractérise par l'étendue des signes cutanés sur l'ensemble du corps. Elle s'observe plus particulièrement chez les personnes immunodéprimées et les personnes âgées et est souvent la conséquence d'un diagnostic tardif.

**Si un de ces signes apparaît, consultez un médecin.**

## Comment se transmet-elle ?

La contamination se fait par contacts directs et prolongés peau à peau avec une personne atteinte de la gale ou, exceptionnellement, par contacts indirects avec des tissus très contaminés (linge de corps, draps).

Les premiers signes apparaissent une à six semaines après la contamination : une personne peut donc être contagieuse sans le savoir.

**La gale commune est peu contagieuse, contrairement à la gale profuse, très contagieuse.**

## La gale, que faut-il faire ?

! Pour que le traitement de la gale soit efficace, il faut traiter simultanément : la personne atteinte de gale, ses contacts proches \*, leur linge et leur environnement.

1

### Traiter la personne atteinte et ses contacts proches\*

Le diagnostic de gale doit être confirmé par un médecin qui prescrira le traitement adapté. Il existe deux types de traitements contre le parasite de la gale :

- un traitement local (crème, émulsion, spray),
- un traitement oral (en comprimés).

Le traitement est à renouveler huit jours plus tard. Après le traitement, les démangeaisons peuvent persister une à deux semaines sur les zones déjà touchées, sans pour autant être un signe d'échec du traitement. Au-delà, il est conseillé de revoir son médecin.

3

### Traiter l'environnement

Un nettoyage classique (aspiration, lavage) des locaux et du mobilier doit toujours être réalisé, avec une aspiration minutieuse des matériaux absorbants (matelas, fauteuils, tapis, etc.)

La pulvérisation d'un acaricide n'apparaît pas nécessaire pour la plupart des gales communes. Il sera à envisager en fonction du contexte (nombre important de cas, répétition des épisodes...). Il est indispensable en cas de gale profuse.

L'usage d'un nettoyeur vapeur est une alternative efficace pour traiter l'environnement.

Il n'y a pas de risque de contamination par les surfaces lisses (vaisselle, couverts, tables, stylos, téléphone, etc).

### 2 Traiter le linge de la personne atteinte et de ses contacts proches\*

Le linge sera traité dès le lendemain du traitement médical. Il s'agit du linge de lit, du linge de toilette ainsi que des vêtements portés dans les trois jours précédents pour la gale commune, huit jours pour la gale profuse.

Deux techniques existent en fonction de la nature du linge :

1. Linge lavable à 60°C (linge de toilette, draps, taies d'oreillers, torchons, essuie-mains...) : lavage en machine à 60°C avec les produits de lavage habituels

2. Linge non lavable à 60°C (vêtements, couvertures, couettes, oreillers...) : désinfection avec un produit acaricide de type "APAR®" acheté en pharmacie, à utiliser dans une pièce aérée et loin de toute flamme.
  - pulvériser sur chaque pièce de linge,
  - mettre le linge dans un sac plastique,
  - le fermer et laisser agir le temps indiqué,
  - laver en machine.

À défaut de produit acaricide, le linge non lavable à 60°C peut être mis dans des sacs plastiques fermés au moins trois jours pour la gale commune, au moins huit jours pour la gale profuse, à une température supérieure à 20°C.

! Les produits acaricides ne doivent pas être manipulés par ou en présence d'une personne asthmatique.

\* Contacts proches : personnes ayant des contacts cutanés prolongés avec une autre personne atteinte de gale (vivant sous le même toit, ayant des relations sexuelles, apportant des soins, etc.).